ICM 2002 · Vol. I · 383–400

arXiv:math/0212399v1 [math.NT] 1 Dec 2002

Chtoucas de Drinfeld, Formule des Traces d'Arthur-Selberg et Correspondance de Langlands

Laurent Lafforgue*

Résumé

Cet exposé est consacré à la preuve de la correspondance de Langlands pour les groupes GL_r sur les corps de fonctions.

Code matière (AMS 2000): 11F, 11F52, 11F60, 11F66, 11F70, 11F72, 11F80, 11R39, 14G35, 14H60, 22E55.
Mots-Clés: Chtoucas, Variétés modulaires de Drinfeld, Modules des fibrés sur les courbes, Correspondance de Langlands, Corps de fonctions, Représentations galoisiennes, Représentations automorphes, Fonctions L, Cohomologie ℓ-adique, Correspondances de Hecke, Formule des traces d'Arthur-Selberg, Formule des points fixes de Grothendieck-Lefschetz.

Introduction

La géométrie algébrique sur un corps F consiste à étudier les variétés algébriques sur F (c'est-à-dire principalement les objets géométriques définis dans des espaces projectifs par des systèmes d'équations polynomiales à coefficients dans F) et les morphismes ou plus généralement les correspondances qui les relient.

Si ℓ est un nombre premier différent de la caractéristique de F, Grothendieck a associé à toute variété algébrique V sur F ses espaces de cohomologie ℓ-adique $H^\nu_c(V \otimes \overline{F}, \mathbb{Q}_\ell)$, $0 \leq \nu \leq 2 \dim V$, qui sont des représentations du groupe de Galois G_F de F continues et de dimension finie sur $\mathbb{Q}_\ell$. Quand le corps F est de type fini sur $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, la théorie conjecturale des motifs de Grothendieck et les conjectures de Tate prévoient qu'il devrait être possible de remonter des représentations ℓ-adiques de G_F aux variétés projectives lisses sur F et à leurs correspondances si bien que la connaissance de celles-ci serait essentiellement équivalente à celle des représentations ℓ-adiques irréductibles de G_F.

*Institut des Hautes Etudes Scientifiques, Le Bois Marie, 35 route de Chartres, F-91440 Bures-sur-Yvette, France. Courriel : laurent@ihes.fr

Cette perspective pose de façon cruciale la question de dresser la liste de toutes les représentations ℓ-adiques irréductibles de G_F. Quand F est un "corps global", c'est-à-dire une extension finie de $\mathbb{Q}$ ou bien le corps $F(X)$ des fonctions rationnelles d'une courbe X projective lisse sur un corps fini, Langlands a conjecturé que les représentations irréductibles de dimension r de G_F sont paramétrées naturellement par les représentations automorphes cuspidales de GL_r sur F.

L'exposé est consacré à la preuve de la correspondance de Langlands dans le cas des corps de fonctions $F = F(X)$. Un rôle central y est joué par la formule des traces d'Arthur-Selberg que la théorie des chtoucas de Drinfeld permet d'interpréter géométriquement.

1. L'énoncé de la correspondance de Langlands

On considère donc une courbe X projective, lisse et géométriquement connexe sur un corps $\mathbb{F}_q$ à q éléments. On note $F = F(X)$ le corps des fonctions rationnelles sur X et $|X|$ l'ensemble des points fermés de X. Pour $x \in |X|$, on note κ_x son corps résiduel et $\deg(x)$ la dimension de κ_x sur $\mathbb{F}_q$.

1.1. Représentations galoisiennes ℓ-adiques

On note G_F le groupe de Galois de F, c'est-à-dire le groupe des automorphismes d'une clôture séparable $\overline{F}$ de F. C'est un groupe profini.

Soit ℓ un nombre premier différent de la caractéristique de $\mathbb{F}_q$.

Une représentation ℓ-adique σ de G_F est une représentation continue et de dimension finie sur $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ qui est définie sur une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$ et provient d'un faisceau ℓ-adique lisse (ou "système local") sur un ouvert non vide de X. On dit que σ est non ramifiée en un point $x \in |X|$ si x est dans le plus grand ouvert où σ est un système local. Dans ce cas, la fibre σ_x de σ en x est une représentation du groupe de Galois de κ_x lequel est engendré par l'automorphisme Frob_x d'élévation à la puissance $q^{\deg(x)}$ et on peut poser

$$\mathrm{L}_x(\sigma, T) = \det_{\sigma_x}(1 - T \cdot \mathrm{Frob}_x^{-1})^{-1}\,.$$

Pour tout entier $r \geq 1$, on note $\{\sigma\}_r$ l'ensemble des classes d'isomorphie de représentations ℓ-adiques irréductibles de dimension r de G_F dont le déterminant est d'ordre fini.

1.2. Groupes adéliques et algèbres de Hecke

Tout point $x \in |X|$ induit sur F la valuation

$$\deg_x : F^\times \mapsto \mathbb{Z} \qquad f \mapsto \deg_x(f) = \text{ l'ordre d'annulation de } f \text{ en } x.$$

On note F_x le corps complété de F en x ; il contient comme sous-anneau d'entiers $O_x = \{f_x \in F_x \mid \deg_x(f_x) \geq 0\}$ qui est compact.

L'anneau $\mathbb{A}$ des adèles de F est le produit "restreint" $\prod_{x \in |X|} F_x$ des familles $f_x \in F_x$, $x \in |X|$, telles que $f_x \in O_x$ pour presque tout x (c'est-à-dire tout x sauf

un nombre fini). Il contient comme sous-anneau compact des entiers $O_{\mathbb{A}} = \prod_{x \in |X|} O_x = \varprojlim_N \mathcal{O}_N$, où N décrit l'ensemble des "niveaux" c'est-à-dire des sous-schémas fermés finis $N = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_N \hookrightarrow X$.

L'anneau $\mathbb{A}$ contient F comme sous-groupe additif discret cocompact et le noyau $\mathbb{A}^{\times 0}$ de l'homomorphisme

$$\deg : \mathbb{A}^\times \to \mathbb{Z} \qquad (f_x) \mapsto \sum_{x \in |X|} \deg(x)\, \deg_x(f_x)$$

contient $F^\times$ comme sous-groupe discret cocompact.

Pour tout entier $r \geq 1$, le groupe topologique $\mathrm{GL}_r(F_x)$ [resp. $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A}) = \prod_{x \in |X|} \mathrm{GL}_r(F_x)$] a une mesure de Haar $\mathrm{d}g_x$ [resp. $\mathrm{d}g_{\mathbb{A}} = \prod \mathrm{d}g_x$] qui attribue le volume 1 au sous-groupe ouvert compact maximal $K_x = \mathrm{GL}_r(O_x)$ [resp. $K = \mathrm{GL}_r(O_{\mathbb{A}}) = \prod K_x$]. L'algèbre de Hecke est l'algèbre de convolution $\mathcal{H}^r_x$ [resp. $\mathcal{H}^r = \otimes \mathcal{H}^r_x$] des fonctions localement constantes à support compact sur $\mathrm{GL}_r(F_x)$ [resp. $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A})$]. Elle est réunion filtrante des sous-algèbres $\mathcal{H}^r_{N,x}$ [resp. $\mathcal{H}^r_N = \otimes \mathcal{H}^r_{N,x}$] des fonctions bi-invariantes par les sous-groupes ouverts d'indice fini $K_{N,x} = \operatorname{Ker}(K_x \to \mathrm{GL}_r(\mathcal{O}_N))$ [resp. $K_N = \prod K_{N,x} = \operatorname{Ker}(K \twoheadrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathcal{O}_N)$]. Chaque $\mathcal{H}^r_{N,x}$ [resp. $\mathcal{H}^r_N$] a une unité $\mathbb{1}_{N,x}$ [resp. $\mathbb{1}_N = \otimes \mathbb{1}_{N,x}$].

On s'intéresse aux représentations "lisses admissibles irréductibles" de $\mathrm{GL}_r(F_x)$ [resp. $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A})$]. Ce sont les modules simples π_x sur $\mathcal{H}^r_x$ [resp. π sur $\mathcal{H}^r$] qui sont réunions filtrantes des $\pi_x \cdot \mathbb{1}_{N,x}$ [resp. $\pi \cdot \mathbb{1}_N$] supposés de dimension finie. Chaque $\pi_x \cdot \mathbb{1}_{N,x}$ [resp. $\pi \cdot \mathbb{1}_N$] est un module sur $\mathcal{H}^r_{N,x}$ [resp. $\mathcal{H}^r_N$], et s'il n'est pas nul il est simple et caractérise π_x [resp. π]. L'unité $\mathbb{1}_{\emptyset,x}$ de l'algèbre de Hecke "sphérique" $\mathcal{H}^r_{\emptyset,x}$ est la fonction caractéristique de $K_x = \mathrm{GL}_r(O_x)$; quand $\pi_x \cdot \mathbb{1}_{\emptyset,x} \neq 0$, on dit que π_x est "non ramifiée". Enfin, les représentations lisses admissibles irréductibles de $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A})$ sont celles de la forme $\pi = \bigotimes_{x \in |X|} \pi_x$ où les π_x sont des représentations lisses admissibles irréductibles des $\mathrm{GL}_r(F_x)$ presque toutes non ramifiées.

Théorème (Satake). – *L'algèbre sphérique $\mathcal{H}^r_{\emptyset,x}$ est commutative et isomorphe à l'algèbre des polynômes symétriques en $Z_1, Z_1^{-1}, \ldots, Z_r, Z_r^{-1}$.*

Par conséquent, une représentation lisse admissible non ramifiées irréductible π_x de $\mathrm{GL}_r(F_x)$ est caractérisée par r scalaires non nuls $z_1(\pi_x), \ldots, z_r(\pi_x)$ (appelés valeurs propres de Hecke) bien définis à l'ordre près ou par

$$\mathrm{L}(\pi_x, T) = \prod_{i=1}^{r} (1 - T \cdot z_i(\pi_x)^{-1})^{-1}\,.$$

Et si $\pi = \otimes \pi_x$ est une représentation lisse admissible irréductible de $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A})$, $\mathrm{L}_x(\pi, T) = \mathrm{L}(\pi_x, T)$ est défini déjà en tout x où π_x est non ramifiée, donc en presque tout x.

1.3. Représentations automorphes cuspidales et décomposition spectrale de Langlands

Pour tout entier $r \geq 1$, $\mathrm{GL}_r(F)$ est un sous-groupe discret de covolume fini (mais non cocompact si $r \geq 2$) dans $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A})^0 = \mathrm{Ker}(\mathrm{GL}_r(\mathbb{A}) \xrightarrow{\det} \mathbb{A}^\times \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z})$. La théorie automorphe consiste à étudier le quotient

$$\mathrm{GL}_r(F) \backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})$$

via l'espace de ses fonctions muni de l'action de $\mathcal{H}^r$ par convolution à droite.

Considérons d'abord l'espace des fonctions φ sur $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A})$ qui sont localement constantes, à support compact, invariantes à gauche par $\mathrm{GL}_r(F)$ et vérifient $\varphi(ag) = \varphi(g)$, $\forall\, g$, pour un certain $a \in \mathbb{A}^\times$ de degré $\neq 0$ et la condition de "cuspidalité"

$$\int_{N_P(F)\backslash N_P(\mathbb{A})} \varphi(n_P\, g) \cdot \mathrm{d}n_P = 0\,, \quad \forall\, g \in \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})\,, \quad \forall\, P \subsetneq \mathrm{GL}_r\,,$$

où P décrit l'ensemble des sous-groupes paraboliques standard de GL_r, N_P désigne le radical unipotent de P et $\mathrm{d}n_P$ une mesure de Haar sur $N_P(\mathbb{A})$.

Il s'écrit comme une somme directe de représentations lisses admissibles irréductibles de $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A})$ appelées les représentations automorphes cuspidales. On note $\{\pi\}_r$ leur ensemble. Chaque $\pi \in \{\pi\}_r$ a un caractère central χ_π d'ordre fini.

On doit aussi introduire les paires (Q, π) constituées d'un sous-groupe parabolique standard $Q \subsetneq \mathrm{GL}_r$ associé à une partition $r = r_1 + \cdots + r_k$, avec pour sous-groupe de Lévi $M_Q = \mathrm{GL}_{r_1} \times \cdots \times \mathrm{GL}_{r_k}$, et d'une représentation irréductible π de $M_Q(\mathbb{A})$ qui est le produit $\pi_1 \otimes \ldots \otimes \pi_k$ de représentations automorphes cuspidales $\pi_1, \ldots, \pi_k$ de $\mathrm{GL}_{r_1}(\mathbb{A}), \ldots, \mathrm{GL}_{r_k}(\mathbb{A})$.

Deux paires (Q, π) et (Q', π') sont dites équivalentes s'il existe une permutation σ échangeant les facteurs de $M_Q = \mathrm{GL}_{r_1} \times \ldots \times \mathrm{GL}_{r_k}$ et de $M_{Q'}$ et un caractère λ de $M_Q(\mathbb{A})$ "non ramifié" c'est-à-dire se factorisant à travers l'homomorphisme

$$\mathrm{GL}_{r_1}(\mathbb{A}) \times \ldots \times \mathrm{GL}_{r_k}(\mathbb{A}) \xrightarrow{\det} (\mathbb{A}^\times)^k \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z}^k$$

tels que $\pi' \cong \sigma(\lambda \otimes \pi)$. On choisit un représentant (Q, π) dans chaque classe d'équivalence.

Soit $a \in \mathbb{A}^\times$ un adèle inversible de degré non nul. L'espace de Hilbert $L^2(\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/a^{\mathbb{Z}})$ des fonctions de carré intégrable sur $\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/a^{\mathbb{Z}}$ est muni d'une action de l'algèbre de Hecke $\mathcal{H}^r$ par convolution à droite. Le théorème fondamental de la théorie des fonctions automorphes décrit sa décomposition comme somme de représentations irréductibles :

Théorème de décomposition spectrale de Langlands. – *On a*

$$L^2(\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/a^{\mathbb{Z}}) = \bigoplus_{\substack{\pi \in \{\pi\}_r \\ \chi_\pi(a)=1}} \pi \oplus \bigoplus_{(Q,\pi)} [\textit{somme continue de représentations irréductibles construites à partir de } (Q,\pi) \textit{ via la théorie des séries d'Eisenstein}].$$

Nous énonçons ici ce théorème en termes très vagues. En effet, on a seulement besoin de savoir pour la suite que les représentations automorphes cuspidales de GL_r apparaissent dans la somme et que tout le reste provient des rangs $< r$.

1.4. La correspondance de Langlands sur les corps de fonctions

On choisit un isomorphisme algébrique entre $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ et $\mathbb{C}$.

Avec Langlands, disons qu'une représentation automorphe cuspidale π de GL_r et une représentation ℓ-adique σ de G_F irréductible de dimension r se correspondent si, en tout $x \in |X|$ où π est non ramifiée, σ est non ramifiée et

$$\mathrm{L}_x(\sigma, T) = \mathrm{L}_x(\pi, T)\,.$$

Théorème. – *Pour tout entier $r \geq 1$, cette correspondance définit une bijection*

$$\{\pi\}_r \cong \{\sigma\}_r \qquad \pi \mapsto \sigma_\pi\ , \qquad \sigma \mapsto \pi_\sigma\,.$$

Le cas $r = 1$ est la théorie du corps de classes global pour $F = F(X)$.

Le cas $r = 2$ a été démontré par Drinfeld au début des années 70 en inventant les chtoucas et étudiant ceux de rang 2.

Le cas $r \geq 3$ a été démontré par l'auteur il y a deux ans en étudiant les chtoucas de Drinfeld de rang r.

On sait que l'isomorphisme de Satake s'étend en une "correspondance de Langlands locale" qui, pour tous les corps F_x localisés de $F = F(X)$ en les points $x \in |X|$, a été démontrée il y a dix ans par Laumon, Rapoport et Stuhler en étudiant la cohomologie ℓ-adique des variétés modulaires de "$\mathcal{D}$-faisceaux elliptiques". Elle fait se correspondre les représentations ℓ-adiques de dimension r du groupe de Galois G_{F_x} de F_x et les représentations lisses admissibles irréductibles de $\mathrm{GL}_r(F_x)$.

La correspondance globale du théorème ci-dessus est compatible avec la correspondance locale au sens que si $\pi \in \{\pi\}_r$ et $\sigma \in \{\sigma\}_r$ se correspondent au sens global, alors en tout point $x \in |X|$ (y compris ceux où il y a ramification), le facteur local π_x de π en x et la restriction σ_x de σ à G_{F_x} se correspondent au sens local.

2. Formule des traces d'Arthur-Selberg et chtoucas de Drinfeld

On va commencer à expliquer la démonstration de la correspondance de Langlands en rang r. La première chose importante à dire est qu'elle se fait par récurrence. On suppose $r \geq 2$ et la correspondance déjà connue en tous les rangs $r' < r$.

2.1. Des représentations galoisiennes vers les représentations automorphes

Pour $\sigma \in \{\sigma\}_r$, l'unicité de $\pi_\sigma \in \{\pi\}_r$ lui correspondant au sens de Langlands résulte du "théorème de multiplicité 1 fort" de Piatetski-Shapiro qui dit qu'une représentation automorphe cuspidale de GL_r est caractérisée par la connaissance de ses valeurs propres de Hecke en presque tout $x \in |X|$.

Quant à l'existence de π_σ, il est connu depuis les années 80 (avec la "formule du produit" de Laumon) qu'elle résulte de la correspondance de Langlands en les rangs $r' < r$. Rappelons comment :

La théorie des modèles de Whittaker permet d'associer à σ une représentation lisse admissible irréductible π de GL_r qui, en tout x où σ est non ramifiée, est non ramifiée et vérifie $\mathrm{L}_x(\pi, T) = \mathrm{L}_x(\sigma, T)$, et qui est réalisée dans un espace de fonctions φ sur $P_1(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})$, où $P_1 \subsetneq \mathrm{GL}_r$ désigne le sous-groupe parabolique standard de type $r = (r-1)+1$. Le problème est de montrer que toutes ces fonctions φ sont invariantes à gauche par $\mathrm{GL}_r(F)$ tout entier.

D'après les "théorèmes réciproques" de Hecke, Weil (pour GL_2) et Piatetski-Shapiro (pour GL_r, $r \geq 3$), c'est équivalent à montrer que pour tout $r' < r$ et toute représentation automorphe cuspidale $\pi' \in \{\pi\}_{r'}$, la fonction L globale

$$\mathrm{L}(\sigma \times \pi', T)$$

est un polynôme qui vérifie une certaine équation fonctionnelle.

Or, d'après l'hypothèse de récurrence, π' correspond à une représentation galoisienne $\sigma' \in \{\sigma\}_{r'}$ et on peut écrire

$$\mathrm{L}(\sigma \times \pi', T) = \mathrm{L}(\sigma \otimes \sigma', T)\,.$$

Comme on est sur un corps de fonctions $F = F(X)$, on sait grâce à Grothendieck qu'une telle fonction L galoisienne $\mathrm{L}(\sigma \otimes \sigma', T)$ est un polynôme et vérifie une équation fonctionnelle induite par la dualité de Poincaré sur la courbe X. Il faut encore vérifier que la constante dans l'équation fonctionnelle est celle qu'on veut et ceci est la formule du produit de Laumon.

2.2. Quotients adéliques et fibrés vectoriels sur la courbe

Les différentes approches géométriques de Drinfeld pour le programme de Langlands sur les corps de fonctions sont fondées sur la remarque suivante d'André Weil :

Lemme. – *Le quotient double* $\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/K$ *s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphie de fibrés vectoriels de rang* r *sur la courbe* X*.*

Plus généralement, si $K_N \subseteq K = \mathrm{GL}_r(O_{\mathbb{A}})$ *est le sous-groupe ouvert associé à un niveau* $N \hookrightarrow X$, $\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/K_N$ *s'identifie à l'ensemble des classes de fibrés* $\mathcal{E}$ *de rang* r *sur* X *munis d'une structure de niveau* N *c'est-à-dire d'un isomorphisme* $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_N = \mathcal{E}_N \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X^r$*.*

Autrement dit, $\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/K$ est l'ensemble des points à valeurs dans $\mathbb{F}_q$ du champ $\mathcal{V}ec^r$ des fibrés vectoriels de rang r sur X.

Cette identification a permis à Drinfeld de construire l'application $\sigma \mapsto \pi_\sigma$ en rang $r = 2$ d'une façon purement géométrique, construction qui, dans le cas non ramifié ($N = \emptyset$), a été progressivement généralisée en rang r arbitraire par Laumon, Kazhdan, Frenkel, Gaitsgory, Vilonen.

On part d'une représentation ℓ-adique partout non ramifiée $\sigma \in \{\sigma\}_r$ qu'on voit comme un système local sur X supposé absolument irréductible. En réinterprétant géométriquement la construction des modèles de Whittaker, on lui associe un certain complexe Aut'_σ de faisceaux ℓ-adiques sur le champ $\mathcal{V}ec'^r$ des fibrés $\mathcal{E}$ de rang r sur X munis d'un plongement $\Omega_X^1 \hookrightarrow \mathcal{E}$ du fibré inversible canonique de X. Le quotient $P_1(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/K$ s'identifie à l'ensemble des points à valeurs dans $\mathbb{F}_q$ d'un certain ouvert de $\mathcal{V}ec'^r$ et la fonction φ qui associe à tout tel point la somme alternée des traces de l'élément de Frobenius agissant sur la fibre de Aut'_σ en ce point est celle associée à σ par la théorie classique des modèles de Whittaker. Le problème est de montrer que Aut'_σ "se descend" par le morphisme $\mathcal{V}ec'^r \to \mathcal{V}ec^r$ d'oubli des plongements de Ω_X^1 c'est-à-dire qu'il est l'image réciproque d'un certain faisceau pervers Aut_σ sur $\mathcal{V}ec^r$. Or il y a un grand ouvert de $\mathcal{V}ec^r$ au-dessus duquel le quotient de $\mathcal{V}ec'^r$ par $\mathbb{G}_m$ est un fibré projectif. Comme les espaces projectifs sont simplement connexes, la descente se fait automatiquement si l'on sait que la restriction de Aut'_σ au-dessus de cet ouvert est un système local ($\mathbb{G}_m$-équivariant). Frenkel, Gaitsgory et Vilonen ont montré que cette propriété résulte de l'annulation de certains foncteurs cohomologiques dits "de moyennisation" et Gaitsgory a récemment démontré cet énoncé d'annulation par des arguments purement géométriques.

On voit que cette démonstration de l'existence de l'application $\sigma \mapsto \pi_\sigma$ est profondément différente de celle du paragraphe précédent car ici la descente repose sur la simple connexité des espaces projectifs et non plus sur les propriétés des fonctions L déduites de l'existence des applications $\pi' \mapsto \sigma_{\pi'}$ en rangs $< r$.

2.3. La formule des traces d'Arthur-Selberg

On veut aborder maintenant la construction de l'application $\pi \mapsto \sigma_\pi$. L'unicité des σ_π correspondant aux $\pi \in \{\pi\}_r$ résulte du théorème de densité de Chebotarev.

Pour l'existence, il faut commencer par avoir une prise sur l'ensemble $\{\pi\}_r$. Une telle prise est fournie par la formule des traces d'Arthur-Selberg que nous rappelons :

L'image $\varphi * h$ d'une fonction $\varphi \in L^2(\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/a^{\mathbb{Z}})$ par convolution par

$h \in \mathcal{H}^r$ est donnée par

$$(\varphi * h)(g') = \int_{\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/a^{\mathbb{Z}}} K_{h,G}(g', g)\, \varphi(g) \cdot \mathrm{d}g$$

où

$$K_{h,G}(g', g) = \sum_{\substack{\gamma \in \mathrm{GL}_r(F) \\ n \in \mathbb{Z}}} h(g^{-1}\, \gamma\, a^n\, g')\,.$$

Pour $r \geq 2$, le quotient $\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/a^{\mathbb{Z}}$ a certes un volume fini mais il n'est pas compact si bien que l'action de $h \in \mathcal{H}^r$ n'a pas de trace au sens que l'intégrale

$$\text{“}\,\mathrm{Tr}(h)\text{”} = \int_{\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/a^{\mathbb{Z}}} K_{h,G}(g, g) \cdot \mathrm{d}g$$

diverge en général. Il résulte du théorème de décomposition spectrale de Langlands que le noyau $K_{h,G}$ s'écrit naturellement

$$K_{h,G} = \sum_{\substack{\pi \in \{\pi\}_r \\ \chi_\pi(a) = 1}} K^{\pi}_{h,G} + \sum_{(Q,\pi)} K^{Q,\pi}_{h,G}$$

et il faut préciser que le problème de divergence provient des $Q \subsetneq G = \mathrm{GL}_r$.

Pour cette raison, on introduit les troncatures d'Arthur :

Pour tout sous-groupe parabolique standard $P \subsetneq G$, l'action de h sur $L^2(P(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})/a^{\mathbb{Z}})$ a un noyau

$$(g', g) \mapsto K_{h,P}(g', g) = \sum_{\substack{\gamma \in P(F) \\ n \in \mathbb{Z}}} h(g^{-1}\, \gamma\, a^n\, g')$$

qui se décompose naturellement en une somme

$$K_{h,P} = \sum_{(Q,\pi)} K^{Q,\pi}_{h,P}$$

où n'apparaissent que les Q tels que $M_Q \subseteq M_P$ à permutation près des facteurs.

On considère un polygone de troncature, c'est-à-dire une fonction convexe $p : [0, r] \to \mathbb{R}_+$, s'annulant en 0 et r et affine sur chaque intervalle $[r' - 1, r']$, $0 < r' \leq r$. On pose

$$K^{\leq p}_{h,G}(g, g) = K_{h,G}(g, g) + \sum_{P \subsetneq \mathrm{GL}_r = G} (-1)^{|P|-1} \sum_{\delta \in P(F)\backslash G(F)} \mathbb{1}^p_P(\delta g)\, K_{h,P}(\delta g, \delta g)$$

où $|P|$ désigne le nombre de facteurs de chaque M_P et $\mathbb{1}^p_P$ est une fonction caractéristique (prenant les valeurs 1 ou 0) sur $P(F)\backslash G(\mathbb{A})$ qui dépend du polygone de troncature p. Puis on pose

$$\mathrm{Tr}^{\leq p}(h) = \int_{G(F)\backslash G(\mathbb{A})/a^{\mathbb{Z}}} K^{\leq p}_{h,G}(g, g) \cdot \mathrm{d}g\,.$$

On définit aussi des $\mathrm{Tr}^{\leq p}_{Q,\pi}(h)$ par des sommes alternées et intégrales semblables à partir des $K^{Q,\pi}_{h,P}(\cdot,\cdot)$.

Comme conséquence du théorème de décomposition spectrale de Langlands, on montre :

Théorème (formule des traces d'Arthur-Selberg). – *Toutes ces intégrales convergent et on a*

$$\mathrm{Tr}^{\leq p}(h) = \sum_{\substack{\pi \in \{\pi\}_r \\ \chi_\pi(a)=1}} \mathrm{Tr}_\pi(h) + \sum_{(Q,\pi)} \mathrm{Tr}^{\leq p}_{Q,\pi}(h)\,.$$

On voit donc que dans $\mathrm{Tr}^{\leq p}(h)$ apparaissent toutes les traces $\mathrm{Tr}_\pi(h)$ plus d'autres termes (qui peuvent être explicités). Ceux-ci sont très compliqués, ils dépendent du polygone de troncature p et ils ne sont pas invariants par conjugaison de h mais le plus important est qu'ils proviennent des rangs $< r$.

Un autre point important est que les troncatures d'Arthur trouvent un sens géométrique dans l'équivalence de Weil :

Proposition. – *Si le polygone de troncature $p : [0,r] \to \mathbb{R}_+$ est "assez convexe" (c'est-à-dire si les différences de pentes $[p(r') - p(r'-1)] - [p(r'+1) - p(r')]$, $0 < r' < r$, sont assez grandes) en fonction de h, alors pour tout $g \in G(F)\backslash G(\mathbb{A})$ auquel est associé un fibré $\mathcal{E}$ de rang r sur X, on a*

$$K^{\leq p}_{h,G}(g,g) = \begin{cases} K_{h,G}(g,g) & \text{si le polygone canonique de Harder-Narasimhan} \\ & \text{de } \mathcal{E} \text{ est} \leq p, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

2.4. Les chtoucas de Drinfeld

Pour être exploitée, la formule des traces d'Arthur-Selberg a besoin d'être combinée avec autre chose. Les chtoucas de Drinfeld vont permettre de lui donner une interprétation géométrique et de là une interprétation cohomologique via le théorème des points fixes de Grothendieck-Lefschetz.

Le problème est de construire des représentations ℓ-adiques σ_π de G_F. En géométrie algébrique, on peut construire des représentations galoisiennes en définissant des variétés sur F (ou sur X ou, comme il va se produire, sur $X \times X$) et en prenant leur cohomologie ℓ-adique (ou celle de leur fibre générique). Dans notre situation, il faut bien sûr que ces variétés aient un rapport étroit avec les représentations automorphes et donc avec le quotient $\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})$.

Revenant à l'équivalence de Weil, on remarque que se donner un fibré sur X équivaut à se donner un fibré $\mathcal{E}$ sur $\overline{X} = X \otimes_{\mathbb{F}_q} \overline{\mathbb{F}}_q$ muni d'un isomorphisme avec son transformé ${}^\tau\mathcal{E} = (\mathrm{Id}_X \otimes \mathrm{Frob})^*\mathcal{E}$ par l'endomorphisme de Frobenius. Drinfeld a découvert qu'en autorisant cet isomorphisme $\mathcal{E} \cong {}^\tau\mathcal{E}$ à avoir un pôle et un zéro, on définit un problème de modules dont le classifiant répond à la question posée :

Définition (Drinfeld). – (i) *Un chtouca de rang r à valeurs dans un schéma S (sur le corps de base $\mathbb{F}_q$) consiste en*

• *un fibré* $\mathcal{E}$ *localement libre de rang* r *sur* $X \times S$,

• *une modification de* $\mathcal{E}$ *c'est-à-dire un diagramme*

$$\mathcal{E} \overset{j}{\hookrightarrow} \mathcal{E}' \overset{t}{\hookleftarrow} \mathcal{E}''$$

où $\mathcal{E}', \mathcal{E}''$ *sont des fibrés sur* $X \times S$ *et où* j, t *sont des plongements dont les conoyaux sont supportés par les graphes de deux morphismes* $\infty, 0 : S \to X$ *et sont inversibles comme faisceaux cohérents sur* $\mathcal{O}_S$,

• *un isomorphisme* $(\mathrm{Id}_X \times \mathrm{Frob}_S)^* \mathcal{E} = {}^{\tau}\mathcal{E} \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}''$.

(ii) *Une structure de niveau* $N \hookrightarrow X$ *sur un tel chtouca (dont le pôle* ∞ *et le zéro* 0 *évitent* N*) est un isomorphisme* $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times S}} \mathcal{O}_{N\times S} = \mathcal{E}_N \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}^r_{N\times S}$ *compatible avec l'isomorphisme* ${}^{\tau}\mathcal{E}_N \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}_N$.

Quand S varie, les groupoïdes de chtoucas de rang r [resp. et avec structures de niveau N] constituent un champ Cht^r [resp. Cht^r_N] dont on montre qu'il est algébrique au sens de Deligne-Mumford et localement de type fini. Voici les principales propriétés de ces champs modulaires :

• D'associer à tout chtouca son pôle et son zéro définit un morphisme

$$(\infty, 0) : \mathrm{Cht}^r \to X \times X \qquad [\text{resp. } \mathrm{Cht}^r_N \to (X - N) \times (X - N)]$$

qui est lisse de dimension relative $2r - 2$.

• Chaque Cht^r_N est représentable fini étale galoisien de groupe $\mathrm{GL}_r(\mathcal{O}_N)$ au-dessus de $\mathrm{Cht}^r \times_{X\times X} (X - N) \times (X - N)$.

• Chaque Cht^r_N est muni d'une action du groupe $F^\times \backslash \mathbb{A}^\times$ et d'une action par correspondances finies étales de la sous-algèbre de Hecke $\mathcal{H}^r_N$.

On s'intéresse aux espaces de cohomologie ℓ-adique à supports compacts $H^\nu_c(\mathrm{Cht}^r_N / a^{\mathbb{Z}})$, $0 \leq \nu \leq 2(2r-2)$, des $\mathrm{Cht}^r_N / a^{\mathbb{Z}}$ au-dessus du point générique $\operatorname{Spec} F^2$ de $X \times X$. Ils sont munis d'une double action du groupe de Galois G_{F^2} et des algèbres $\mathcal{H}^r_N$. Notre but va être de les calculer au moins partiellement et de montrer qu'ils réalisent l'application $\pi \mapsto \sigma_\pi$.

Chaque $\mathrm{Cht}^r_N / a^{\mathbb{Z}}$ n'a qu'un nombre fini de composantes connexes (ce qui correspond au fait que le volume de $\mathrm{GL}_r(F) \backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A}) / a^{\mathbb{Z}}$ est fini) mais il n'est pas de type fini (de même que $\mathrm{GL}_r(F) \backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A}) / a^{\mathbb{Z}}$ n'est pas compact), ses espaces de cohomologie ℓ-adique sont de dimension infinie (de même que la décomposition spectrale de $L^2(\mathrm{GL}_r(F) \backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A}) / a^{\mathbb{Z}})$ fait apparaître des sommes continues) et les correspondances de Hecke composées avec les éléments de Frobenius ont une infinité de points fixes (de même que les intégrales "$\mathrm{Tr}(h)$" divergent).

Pour surmonter cette difficulté, on considère à nouveau un polygone de troncature $p : [0, r] \to \mathbb{R}_+$ et on demande aux chtoucas que leur polygone canonique de Harder-Narasimhan (qui se définit facilement car un chtouca est un fibré muni d'une structure supplémentaire) soit $\leq p$. Cela définit des ouverts $\mathrm{Cht}^{r,\overline{p} \leq p}_N$ dans les Cht^r_N dont les quotients par $a^{\mathbb{Z}}$ sont de type fini (de même que les intégrales $\mathrm{Tr}^{\leq p}(h)$ convergent).

Une fonction $h \in \mathcal{H}_N^r$ contient en facteur la fonction caractéristique $\mathbb{1}_y$ de $\mathrm{GL}_r(O_y)$ dans $\mathrm{GL}_r(F_y)$ en presque tout $y \in |X|$. On considère un point fermé x de $(X-N)\times(X-N)$ dont les deux projections $\infty, 0 \in |X|$ sont distinctes et vérifient cette propriété, et un multiple $s = \deg(\infty)\, s' = \deg(0)\, u'$ de $\deg(x)$. Le composé $h \times \mathrm{Frob}^s$ a dans la fibre de $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$ au-dessus de n'importe quel point de $(X\times X)(\overline{\mathbb{F}}_q)$ supporté par x un nombre fini de points fixes noté

$$\mathrm{Lef}_x(h\times \mathrm{Frob}^s, \mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}})\,.$$

En utilisant une description adélique des points fixes (rendue possible par la proximité des chtoucas avec le quotient $\mathrm{GL}_r(F)\backslash \mathrm{GL}_r(\mathbb{A})$) et le calcul des intégrales orbitales des fonctions sphériques $h_\infty^{-s'}$ et $h_0^{u'}$ sur $\mathrm{GL}_r(F_\infty)$ et $\mathrm{GL}_r(F_0)$ dont les transformés de Satake sont les polynômes symétriques $q^{s\frac{(r-1)}{2}}(Z_1^{-s'}+\cdots+Z_r^{-s'})$ et $q^{s\frac{(r-1)}{2}}(Z_1^{u'}+\cdots+Z_r^{u'})$, on relie ce nombre à la trace tronquée $\mathrm{Tr}^{\leq p}(h')$ de la fonction h' déduite de h en remplaçant les facteurs $\mathbb{1}_\infty$ et $\mathbb{1}_0$ par $h_\infty^{-s'}$ et $h_0^{u'}$. Par combinaison avec la formule des traces d'Arthur-Selberg, on obtient :

Théorème (comptage des points fixes). – *Dans la situation ci-dessus et si p est assez convexe et* $\deg(\infty)$, $\deg(0)$, *s sont assez grands en fonction de h, on a*

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{r!}\sum_{k=1}^{r!}\mathrm{Lef}_{(\mathrm{Frob}_X^k\times \mathrm{Id}_X)(x)}(h\times\mathrm{Frob}^s, \mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}})\\
=\;& q^{(r-1)s}\sum_{\substack{\pi\in\{\pi\}_r\\ \chi_\pi(a)=1}} \mathrm{Tr}_\pi(h)(z_1(\pi_\infty)^{-s'}+\cdots+z_r(\pi_\infty)^{-s'})\\
&\qquad\qquad (z_1(\pi_0)^{u'}+\cdots+z_r(\pi_0)^{u'})\\
+\;& \textit{autres termes où apparaissent les valeurs propres de Hecke en } \infty \textit{ et } 0 \textit{ des}\\
&\textit{représentations automorphes cuspidales des } \mathrm{GL}_{r_1}\times\cdots\times\mathrm{GL}_{r_k},\\
&r_1+\cdots+r_k=r.
\end{aligned}$$

Si dans cette formule il n'y avait que le terme principal et si on disposait sur $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$ d'un théorème des points fixes de Grothendieck-Lefschetz interprétant ces nombres comme la trace sur la cohomologie d'une action des $h\times\mathrm{Frob}_x^{-s/\deg(x)}$ (en notant $\mathrm{Frob}_x \in G_{F^2}$ un élément de Frobenius en x), on aurait une représentation de $\mathcal{H}_N^r \times G_{F^2}$ qui se décomposerait nécessairement en

$$\bigoplus_{\substack{\pi\in\{\pi\}_r\\ \chi_\pi(a)=1}} (\pi\cdot\mathbb{1}_N)\otimes[\sigma_\pi\boxtimes\check{\sigma}_\pi](1-r)$$

et on aurait construit l'application cherchée $\pi\mapsto\sigma_\pi$.

Mais le terme principal n'est pas seul, il y a aussi des termes complémentaires qui dépendent de p et font apparaître les représentations automorphes cuspidales en rangs $<r$, et surtout il n'y a même pas d'action de $\mathcal{H}_N^r$ car les correspondances de Hecke de $\mathrm{Cht}_N^r/a^{\mathbb{Z}}$ ne stabilisent pas les ouverts $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$ (ce qui correspond au fait que les traces tronquées $\mathrm{Tr}^{\leq p}(h)$ ne sont pas invariantes par conjugaison).

3. Donner un sens cohomologique au comptage des points fixes

On vient de dire que les ouverts $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$ ne sont pas stabilisés par les correspondances de Hecke si bien qu'en dehors du cas $h = \mathbb{1}_N$ (c'est-à-dire de la seule action de G_{F^2}) les nombres $\mathrm{Lef}_x(h \times \mathrm{Frob}^s, \mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}})$ n'ont pas a priori de sens cohomologique. On va voir qu'en fait il est possible de leur en donner un plus élaboré.

3.1. Compactifications

On compactifie les ouverts tronqués $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$ pour retrouver des correspondances de Hecke qui agissent sur la cohomologie. On commence par le cas sans niveau :

Pour tout polygone de troncature p assez convexe en fonction du genre de la courbe X, on construit un champ $\overline{\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}}$ algébrique au sens d'Artin, dont les groupes d'automorphismes sont finis (mais ramifiés), qui est muni d'une action de $F^\times\backslash\mathbb{A}^\times$ et d'un morphisme lisse sur $X \times X$, qui contient $\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}$ comme ouvert, dont le bord est un diviseur à croisements normaux relatif et enfin dont le quotient par $a^{\mathbb{Z}}$ est propre (en particulier de type fini et séparé) sur $X \times X$. Les strates de bord $\mathrm{Cht}_{\underline{r}}^{r,\overline{p}\leq p}$ sont naturellement indexées par les partitions $\underline{r} = (r = r_1 + \cdots + r_k)$ de l'entier r. Si on distingue le degré d des chtoucas avec donc $\mathrm{Cht}^r = \coprod_{d\in\mathbb{Z}} \mathrm{Cht}^{r,d}$, $\overline{\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}} = \coprod_{d\in\mathbb{Z}} \overline{\mathrm{Cht}^{r,d,\overline{p}\leq p}}$ et $\mathrm{Cht}_{\underline{r}}^{r,\overline{p}\leq p} = \coprod_{d\in\mathbb{Z}} \mathrm{Cht}_{\underline{r}}^{r,d,\overline{p}\leq p}$, chaque $\mathrm{Cht}_{\underline{r}}^{r,d,\overline{p}\leq p}$ est essentiellement de la forme

$$\mathrm{Cht}^{r_1,d_1,\overline{p}\leq p_1} \times_X \mathrm{Cht}^{r_2,d_2,\overline{p}\leq p_2} \times_{X,\mathrm{Frob}} \cdots \times_{X,\mathrm{Frob}} \mathrm{Cht}^{r_k,d_k,\overline{p}\leq p_k}$$

où $d_1, \ldots, d_k$ et $p_1, \ldots, p_k$ sont des degrés et polygones de troncatures qui se déduisent de d et p. La strate $\mathrm{Cht}_{\underline{r}}^{r,\overline{p}\leq p}$ est munie d'un morphisme vers $X \times X^{k-1} \times X$ où le premier facteur X est le pôle, le dernier facteur X est le zéro et les $k-1$ facteurs X supplémentaires sont appelés les dégénérateurs.

Toute fonction $h \in \mathcal{H}_\emptyset^r$ induit une correspondance sur $\mathrm{Cht}^r/a^{\mathbb{Z}}$. On peut considérer sa trace dans $(\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}})^2$ puis la normalisation de celle-ci sur $(\overline{\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}}/a^{\mathbb{Z}})^2$. Comme $\overline{\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}}/a^{\mathbb{Z}}$ est propre et lisse sur $X \times X$, elle agit sur sa cohomologie.

Considérons maintenant un niveau $N \hookrightarrow X$. La normalisation $\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}/a^{\mathbb{Z}}$ de $\overline{\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}}/a^{\mathbb{Z}} \times_{X\times X} (X-N)\times(X-N)$ dans $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$ contient $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$ comme ouvert et elle est propre sur $(X-N)\times(X-N)$ mais elle n'est pas lisse et l'auteur ignore comment résoudre ses singularités. Toutefois, en demandant que non seulement le pôle et le zéro mais aussi les dégénérateurs évitent N, on définit un ouvert $\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}'/a^{\mathbb{Z}}$ de $\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}/a^{\mathbb{Z}}$ qui contient strictement $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$, est lisse sur $X \times X$ et dont le bord est un diviseur à croisements normaux relatif. Les

correspondances de Hecke $h \in \mathcal{H}_N^r$ agissent sur sa cohomologie d'après le théorème suivant :

Théorème de stabilité globale. – *Les correspondances de Hecke étendues par normalisation sur* $(\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}'/a^{\mathbb{Z}})^2$ *stabilisent* $\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}'/a^{\mathbb{Z}}$ *au sens que leurs deux projections sur celui-ci sont propres.*

Ce résultat correspond sans doute au phénomène suivant dans la formule des traces d'Arthur-Selberg : Le défaut d'invariance par conjugaison des traces tronquées $\mathrm{Tr}^{\leq p}(h)$ se mesure par les dérivées logarithmiques des opérateurs d'entrelacement de Langlands. Or ces opérateurs sont des produits eulériens et leurs dérivées logarithmiques sont des sommes sur tous les points $x \in |X|$ lesquels correspondent exactement aux valeurs possibles des dégénérateurs. Il n'y a pas d'entrelacement donc pas d'instabilité d'un point de $|X|$ à un autre et en demandant au pôle, au zéro et aux dégénérateurs d'éviter certains points de $|X|$, on garde la propriété de stabilité globale que vérifie automatiquement la compactification toute entière $\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}/a^{\mathbb{Z}}$.

3.2. Cohomologie négligeable et cohomologie essentielle

En résumé, on a maintenant toutes les structures et informations qu'on pourrait souhaiter mais elles sont dispersées entre les différents objets $\mathrm{Cht}_N^r/a^{\mathbb{Z}}$, $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$ et $\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}'/a^{\mathbb{Z}}$:

Sur $\mathrm{Cht}_N^r/a^{\mathbb{Z}}$, on a une action de l'algèbre de Hecke $\mathcal{H}_N^r$ mais la cohomologie est de dimension infinie et les ensembles de points fixes sont infinis.

L'ouvert $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$ est de type fini et on y a une formule de comptage des points fixes qui s'exprime en termes automorphes mais on a perdu l'action des correspondances de Hecke.

Enfin, sur $\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}'/a^{\mathbb{Z}}$ et sa cohomologie il y a à nouveau une action de chaque $h \in \mathcal{H}_N^r$ mais on ne donne pas de comptage des points fixes et surtout il n'y a pas d'action de l'algèbre $\mathcal{H}_N^r$ car la normalisation des correspondances de Hecke ne commute pas avec la multiplication.

L'idée est de définir dans toute représentation ℓ-adique de G_{F^2} (après semi-simplification) une partie "négligeable" et une partie "essentielle", de façon que les $\mathrm{Cht}_N^r/a^{\mathbb{Z}}$, $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$ et $\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}'/a^{\mathbb{Z}}$ aient même cohomologie essentielle (ce qui permettra de rassembler sur celle-ci les informations dispersées dont on dispose) et que les traces des actions sur la cohomologie essentielle soient données par les termes principaux dans la formule de comptage des points fixes, ceux associés aux représentations automorphes cuspidales $\pi \in \{\pi\}_r$ de GL_r.

Or on s'attend à ce que les $\pi \in \{\pi\}_r$ correspondent à des représentations ℓ-adiques de G_F irréductibles de dimension r. Quant aux termes complémentaires dans la formule de comptage, ils sont associés aux représentations automorphes cuspidales en rangs $< r$ lesquelles correspondent, d'après l'hypothèse de récurrence, aux représentations ℓ-adiques de G_F irréductibles de dimension $< r$. Cela dicte la

définition suivante (où $q', q'' : G_{F^2} \rightrightarrows G_F$ sont les deux homomorphismes induits par $X \times X \rightrightarrows X$) :

Définition. – *Une représentation ℓ-adique irréductible de G_{F^2} est dite "r-négligeable" si elle est facteur direct d'une représentation de la forme*

$$q'^{*}\,\sigma' \otimes q''^{*}\,\sigma''$$

avec σ', σ'' deux représentations de G_F irréductibles de rangs $< r$.

Elle est dite "essentielle" sinon.

3.3. Séparation et identification de la cohomologie essentielle

Dans un premier temps, on oublie complètement les correspondances de Hecke et on ne considère que l'action de G_{F^2} sur les différents espaces de cohomologie ℓ-adique à supports compacts. On montre :

Proposition. – *Pour tout niveau $N \hookrightarrow X$, la cohomologie de $\mathrm{Cht}^{r}_{N}/a^{\mathbb{Z}}$ et des $\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}_{N}/a^{\mathbb{Z}}$ et $\overline{\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}_{N}}'/a^{\mathbb{Z}}$ (et la cohomologie d'intersection des $\overline{\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}_{N}}/a^{\mathbb{Z}}$ si $N \neq \emptyset$) ont la même partie essentielle H^{ess}_{N}. Elle est concentrée en degré médian $\nu = 2r-2$ et pure de poids $2r-2$. Si x est un point fermé de $(X-N)\times(X-N)$ dont les deux projections $\infty, 0 \in |X|$ sont distinctes et $s = \deg(\infty)\,s' = \deg(0)\,u'$ est un multiple de $\deg(x)$, on a*

$$\mathrm{Tr}_{H^{\mathrm{ess}}_{N}}(\mathrm{Frob}_x^{-s/\deg(x)}) \;=\; q^{(r-1)s} \sum_{\substack{\pi\,\in\,\{\pi\}_r \\ \chi_\pi(a)=1}} \dim(\pi\cdot \mathbb{1}_N)(z_1(\pi_\infty)^{-s'} + \cdots + z_r(\pi_\infty)^{-s'})$$
$$(z_1(\pi_0)^{u'} + \cdots + z_r(\pi_0)^{u'})\,.$$

Quand $N = \emptyset$, la cohomologie du bord $\overline{\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}}/a^{\mathbb{Z}} - \mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}/a^{\mathbb{Z}}$ est r-négligeable car il est réunion de strates $\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}_{\underline{r}}/a^{\mathbb{Z}}$ indexées par les partitions $\underline{r} = (r = r_1 + \cdots + r_k)$, $k \geq 2$, qui se dévissent en termes de $\mathrm{Cht}^{r_1}, \ldots, \mathrm{Cht}^{r_k}$. Pour $N \neq \emptyset$, un argument plus sophistiqué utilisant ce dévissage montre aussi que les différences entre $\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}_{N}/a^{\mathbb{Z}}$, $\overline{\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}_{N}}'/a^{\mathbb{Z}}$ et $\overline{\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}_{N}}/a^{\mathbb{Z}}$ sont r-négligeables.

La formule de comptage des points fixes du paragraphe 2.4 (avec $h = \mathbb{1}_N$) et le théorème des points fixes de Grothendieck-Lefschetz donnent les traces des éléments $\mathrm{Frob}_x^{-s/\deg(x)}$ agissant sur la cohomologie des $\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}_{N}/a^{\mathbb{Z}}$. La séparation de la partie essentielle se fait en "testant" ces espaces de cohomologie contre des représentations irréductibles r-négligeables arbitraires et en regardant les pôles des fonctions L de paires obtenues. Cela utilise la correspondance de Langlands déjà connue en rangs $< r$ par hypothèse de récurrence et les propriétés classiques des fonctions L de paires tant du côté automorphe que galoisien (en particulier l'interprétation cohomologique de Grothendieck et le théorème de pureté de Deligne).

Enfin, $\mathrm{Cht}^{r}_{N}/a^{\mathbb{Z}}$ et les $\mathrm{Cht}^{r,\overline{p}\leq p}_{N}/a^{\mathbb{Z}}$ ont la même cohomologie essentielle car la formule obtenue pour les traces des $\mathrm{Frob}_x^{-s/\deg(x)}$ ne dépend pas de p.

3.4. Action et traces des correspondances de Hecke

Dans un second temps, on revient aux correspondances de Hecke $h \in \mathcal{H}_N^r$.

On met d'abord une action naturelle de l'algèbre $\mathcal{H}_N^r$ sur la cohomologie essentielle H_N^{ess} en prouvant que $H = H_c^{2r-2}(\mathrm{Cht}_N^r /a^{\mathbb{Z}}) = \varinjlim_p H_c^{2r-2}(\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p} /a^{\mathbb{Z}})$ admet une filtration finie $0 = H_0 \subsetneq \ldots \subsetneq H_i \subsetneq \ldots \subsetneq H_k = H$ respectée par la double action de G_{F^2} et de $\mathcal{H}_N^r$ dont les gradués impairs H_{2i+1}/H_{2i} sont entièrement r-négligeables et les gradués pairs H_{2i+2}/H_{2i+1} sont entièrement essentiels.

Pour terminer, il reste à montrer que pour $h \in \mathcal{H}_N^r$, x et $s = \deg(\infty)\, s' = \deg(0)\, u'$ comme dans l'énoncé de la formule de comptage, on a

$$\mathrm{Tr}_{H_N^{\mathrm{ess}}}(h \times \mathrm{Frob}_x^{-s/\deg(x)}) \quad = \quad q^{(r-1)s} \sum_{\substack{\pi \in \{\pi\}_r \\ \chi_\pi(a)=1}} \mathrm{Tr}_\pi(h)(z_1(\pi_\infty)^{-s'} + \cdots + z_r(\pi_\infty)^{-s'}) \\ (z_1(\pi_0)^{u'} + \cdots + z_r(\pi_0)^{u'})\,.$$

Pour cela, on a besoin d'une formule de Grothendieck-Lefschetz qui relie les nombres de points fixes $\mathrm{Lef}_x(h \times \mathrm{Frob}^s, \mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p} /a^{\mathbb{Z}})$ à l'action de $h \times \mathrm{Frob}^s$ sur la cohomologie de $\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}' /a^{\mathbb{Z}}$ (et ce sera suffisant car on n'a plus alors qu'à combiner une telle formule avec la formule de comptage et à identifier ce qui est "essentiel" des deux côtés par les arguments de fonctions L de paires).

On prouve en fait que pour toute $h \in \mathcal{H}_N^r$ fixée, il existe des correspondances cohomologiques $\mathrm{cl}(h)_{\underline{r}}$ agissant sur la cohomologie des strates $\overline{\mathrm{Cht}_{N,\underline{r}}^{r,\overline{p}\leq p}}' /a^{\mathbb{Z}}$ du bord $\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}' /a^{\mathbb{Z}} - \mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p} /a^{\mathbb{Z}}$ telles que pour tout x et tout s comme plus haut on ait (en notant $H_c^*(\cdot) = \sum_\nu (-1)^\nu\, H_c^\nu(\cdot)^{\mathrm{ss}}$) :

$$\mathrm{Lef}_x(h \times \mathrm{Frob}_s, \mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p} /a^{\mathbb{Z}}) = \mathrm{Tr}_{H_c^*(\overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}' /a^{\mathbb{Z}})}(h \times \mathrm{Frob}_x^{-s/\deg(x)}) \\ + \sum_{\substack{\underline{r}=(r=r_1+\cdots+r_k) \\ k\geq 2}} (-1)^{k-1}\, \mathrm{Tr}_{H_c^*(\overline{\mathrm{Cht}_{N,\underline{r}}^{r,\overline{p}\leq p}}' /a^{\mathbb{Z}})}(\mathrm{cl}(h)_{\underline{r}} \times \mathrm{Frob}_x^{-s/\deg(x)})\,.$$

La preuve de cette formule (qui justifie a posteriori le fait étrange qu'il y ait une formule de comptage des points fixes dans l'ouvert non stable $\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p} /a^{\mathbb{Z}}$) repose sur la propriété géométrique suivante des correspondances de Hecke (qui paraît donc liée à l'existence même de la formule des traces d'Arthur-Selberg) :

Théorème de "stabilité locale". – *Dans $\mathfrak{X} = \overline{\mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p}}' /a^{\mathbb{Z}}$, les correspondances de Hecke h stabilisent l'ouvert $\mathfrak{X}_\emptyset = \mathrm{Cht}_N^{r,\overline{p}\leq p} /a^{\mathbb{Z}}$ "localement au voisinage de leurs points fixes".*

Cela signifie que si $\Gamma \xrightarrow{(p'_\Gamma, p''_\Gamma)} \mathfrak{X} \times \mathfrak{X}$ est le cycle qui supporte h, il existe un ouvert $U \subset \mathfrak{X} \times \mathfrak{X}$ contenant les points fixes de toutes les correspondances $\Gamma \times \mathrm{Frob}^n$, $n \in \mathbb{N}$, tel que

$$p'^{-1}_\Gamma(\mathfrak{X}_\emptyset) \cap U \subseteq p''^{-1}_\Gamma(\mathfrak{X}_\emptyset) \cap U\,.$$

4. Applications du théorème

La correspondance de Langlands entre représentations ℓ-adiques irréductibles du groupe de Galois G_F de F et représentations automorphes cuspidales des groupes GL_r sur F a des conséquences immédiates et importantes dans les deux sens. Voici les principales :

4.1. Conséquences sur les faisceaux ℓ-adiques

On a d'abord des conséquences très fortes dans le cas des courbes :

Théorème. – *Soient X' un ouvert de la courbe X et σ un faisceau ℓ-adique lisse sur X', qui est irréductible de rang r et dont le déterminant est un caractère d'ordre fini. Alors :*

(i) *Il existe un corps de nombres $E \subset \overline{\mathbb{Q}}$ tel qu'en tout point fermé $x \in |X'|$, le polynôme $\mathrm{L}_x(\sigma, T)^{-1} = \det_\sigma(1 - T \cdot \mathrm{Frob}_x^{-1})$ soit à coefficients dans E.*

(ii) *En tout $x \in |X'|$, les racines du polynôme $\det_\sigma(1 - T \cdot \mathrm{Frob}_x^{-1})$ sont des nombres algébriques dont toutes les images complexes sont de module 1. Ce sont des unités λ-adiques en toutes les places λ non archimédiennes et premières à q de E.*

(iii) *Pour toute place λ de E au-dessus d'un nombre premier ℓ' ne divisant pas q, il existe sur X' un faisceau ℓ'-adique σ_λ lisse et irréductible de rang r tel que*

$$\det_\sigma(1 - T \cdot \mathrm{Frob}_x^{-1}) = \det_{\sigma_\lambda}(1 - T \cdot \mathrm{Frob}_x^{-1}), \qquad \forall\, x \in |X'|\,.$$

On voit qu'en dimension 1 sur $\mathbb{F}_q$, un faisceau ℓ-adique irréductible dont le déterminant est d'ordre fini est "pur de poids 0" et "il ne dépend pas du choix de ℓ". La première de ces deux propriétés s'étend automatiquement en dimension arbitraire :

Corollaire. – *Soient $\mathfrak{X}$ une variété normale de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et σ un faisceau ℓ-adique lisse sur $\mathfrak{X}$ qui est irréductible et dont le déterminant est d'ordre fini.*

Alors en tout point fermé x de $\mathfrak{X}$, les valeurs propres de Frobenius de σ sont des nombres algébriques dont toutes les images complexes sont de modules 1.

Et ce sont des unités λ-adiques pour toute place λ première à q.

4.2. Conséquences sur les représentations automorphes

Pour les représentations automorphes cuspidales des groupes linéaires sur $F = F(X)$, on a d'abord des conséquences sur les valeurs propres de Hecke et les fonctions L de paires :

Théorème. – (i) (Conjecture de Ramanujan-Petersson) *Pour toute $\pi \in \{\pi\}_r$, les facteurs locaux π_x de π en les $x \in |X|$ sont tempérés.*

En particulier, en les x où π_x est non ramifié, ses valeurs propres de Hecke vérifient

$$|z_i(\pi_x)| = 1\,, \qquad 1 \leq i \leq r\,.$$

(ii) (Hypothèse de Riemann généralisée) *Pour toute paire* $\pi \in \{\pi\}_r$, $\pi' \in \{\pi\}_{r'}$, *tous les zéros de la fonction* L *globale*

$$\mathrm{L}(\pi \times \pi', T)$$

sont sur le cercle

$$|T| = q^{-1/2}\,.$$

La partie (ii) du théorème est la traduction en termes automorphes du théorème de pureté de Deligne.

D'autre part, on a les cas particuliers suivants de la fonctorialité de Langlands (où, pour toute extension finie F' de F, $\mathbb{A}_{F'}$ désigne son anneau des adèles et $X_{F'}$ la courbe projective lisse associée qui est un revêtement fini de $X = X_F$) :

Théorème. – (i) (Existence du produit tensoriel automorphe) *Soient* π *et* π' *deux représentations automorphes cuspidales de* $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A}_F)$ *et* $\mathrm{GL}_{r'}(\mathbb{A}_F)$. *Alors il existe une partition* $rr' = r_1 + \cdots + r_k$ *et des représentations automorphes cuspidales* $\pi^1, \ldots, \pi^k$ *de* $\mathrm{GL}_{r_1}(\mathbb{A}_F), \ldots, \mathrm{GL}_{r_k}(\mathbb{A}_F)$ *qui, en tout* $x \in |X_F|$ *où* π *et* π' *sont non ramifiées, sont elles-mêmes non ramifiées et vérifient*

$$\{z_j(\pi_x)\, z_{j'}(\pi'_x) \mid 1 \leq j \leq r\,,\ 1 \leq j' \leq r'\} = \coprod_{1 \leq i \leq k} \{z_1(\pi^i_x), \ldots, z_{r_i}(\pi^i_x)\}$$

(ii) (Changement de base) *Soient* F' *une extension finie de* F *et* π *une représentation automorphe cuspidale de* $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A}_F)$. *Alors il existe une partition* $r = r_1 + \cdots + r_k$ *et des représentations automorphes cuspidales* ${\pi'}^1, \ldots, {\pi'}^k$ *de* $\mathrm{GL}_{r_1}(\mathbb{A}_{F'}), \ldots, \mathrm{GL}_{r_k}(\mathbb{A}_{F'})$, *non ramifiées en tout point* $x' \in |X_{F'}|$ *de degré* $\frac{\deg(x')}{\deg(x)}$ *au-dessus d'un point* $x \in |X_F|$ *où* π *est non ramifiée et qui vérifient*

$$\big\{z_1(\pi_x)^{\frac{\deg(x')}{\deg(x)}}, \ldots, z_r(\pi_x)^{\frac{\deg(x')}{\deg(x)}}\big\} = \coprod_{1 \leq i \leq k} \{z_1({\pi'}^i_x), \ldots, z_{r_i}({\pi'}^i_x)\}\,.$$

(iii) (Induction automorphe) *Soient* F' *une extension de* F *de degré* d *et* π' *une représentation automorphe cuspidale de* $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A}_{F'})$. *Alors il existe une partition* $rd = r_1 + \cdots + r_k$ *et des représentations automorphes cuspidales* $\pi^1, \ldots, \pi^k$ *de* $\mathrm{GL}_{r_1}(\mathbb{A}_F), \ldots, \mathrm{GL}_{r_k}(\mathbb{A}_F)$, *non ramifiées en tout point* $x \in |X_F|$ *au-dessus duquel les points* $x' \in |X_{F'}|$ *sont non ramifiées sur* x *et pour* π' *et qui vérifient*

$$\prod_{1 \leq i \leq k} \mathrm{L}_x(\pi^i, T) = \prod_{x'|x} \mathrm{L}_{x'}(\pi', T)\,.$$

Bibliographie

[1] J.G. Arthur, A trace formula for reductive groups I: terms associated to classes in $G(\mathbb{Q})$, *Duke Math. J.* 45 (1978), 911–952.

[2] J.G. Arthur, A trace formula for reductive groups II: applications of a truncation operator, *Comp. Math.* 40 (1) (1980), 87–121.

[3] J.G. Arthur, The trace formula for noncompact quotient, *Proceedings of ICM*, Varsovie (1983), Vol. 2, 849–859.
[4] J.W. Cogdell et I.I. Piatetski-Shapiro, Converse theorems for GL_n, *Pub. Math. IHES* 79 (1994), 157–214.
[5] P. Deligne, La conjecture de Weil II, *Publ. Math. IHES* 52 (1980), 137–252.
[6] V.G. Drinfeld, Langland's Conjecture for GL(2) over functional Fields, *Proceedings of ICM*, Helsinki (1978), 565–574.
[7] V.G. Drinfeld, Two-dimensional ℓ-adic representations of the fundamental group of a curve over a finite field and automorphic forms on GL(2), *Amer. J. Math.* 105 (1983), 85–114.
[8] V.G. Drinfeld, Varieties of modules of F-sheaves, *Funct. Anal. Appl.* 21 (1987), 107–122.
[9] V.G. Drinfeld, Cohomology of compactified manifolds of modules of F-sheaves of rank 2, *J. Sov. Math.* 46 (1989), 1789–1821.
[10] E. Frenkel, D. Gaitsgory et K. Vilonen, On the geometric Langlands conjecture, *J. AMS* 15 (2002), 367–417.
[11] D. Gaitsgory, On a vanishing conjecture appearing in the geometric Langlands correspondence, *prépublication*, http://arXiv.org/abs/math/0204081, (2002).
[12] L. Lafforgue, Chtoucas de Drinfeld et conjecture de Ramanujan-Petersson, *Astérisque* 243, SMF (1997).
[13] L. Lafforgue, Une compactification des champs classifiant les chtoucas de Drinfeld, *J. AMS* 11 (1998), 1001–1036.
[14] L. Lafforgue, Chtoucas de Drinfeld et correspondance de Langlands, *Inv. Math.* 147 (2002), 1–241.
[15] L. Lafforgue, Cours à l'Institut Tata sur les chtoucas de Drinfeld et la correspondance de Langlands, *prépublication*, http://www.ihes.fr/PREPRINTS/M02/Resu/resu-M02-45.html, à paraître dans le volume de l'année spéciale du TIFR de Bombay sur le programme de Langlands géométrique, (2002).
[16] R.P. Langlands, Problems in the theory of Automorphic Forms, dans *Lectures in Modern Analysis and Applications III, LNM* 170 (1970), 18–61.
[17] R.P. Langlands, Automorphic representations, Shimura varieties, and motives. Ein Märchen, *PSPM* XXXIII (2) (1979), 205–246.
[18] G. Laumon, Transformation de Fourier, constantes d'équations fonctionnelles et conjecture de Weil, *Pub. Math. IHES* 65 (1987), 131–210.
[19] G. Laumon, Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, volumes I et II, Cambridge U.P. (1996).
[20] G. Laumon, La correspondance de Langlands sur les corps de fonctions, *Séminaire Bourbaki*, exposé 873 (mars 2000).
[21] G. Laumon, Travaux de Frenkel, Gaitsgory et Vilonen sur la correspondance de Drinfeld-Langlands, *Séminaire Bourbaki*, exposé 906 (juin 2002).
[22] G. Laumon, M. Rapoport et U. Stuhler, $\mathcal{D}$-elliptic sheaves and the Langlands correspondence, *Inv. Math.* 113 (1993), 217–338.
[23] C. Mœglin et J.-L. Waldspurger, Décomposition spectrale et séries d'Eisenstein, *Prog. in Math.* 113 (1989), Birkhaüser.